

OBSERVEZ !



# FAUNE ET FLORE

## CARACTÉRISTIQUE DE LA TOUVRE



### L'IRIS DES MARAIS

#### (*Iris pseudacorus*)

L'iris jaune, est une plante herbacée vivace au port dressé, de marais ou bord de l'eau, de la famille des iridacées. Ses fleurs sont jaunes, longues et ensiformes. Originaire d'Asie, il a été introduit en Europe au 13<sup>ème</sup> siècle. Le nom d'acorus vient du nom du grec « Akoros » qui signifie plante à racine aromatique. Il doit son nom d'odorant à son feuillage qui dégage un subtil et agréable parfum, plus précisément de mandarine, dès qu'on le froisse.



### LE BIHOREAU

#### (*Nycticorax nycticorax*)

Le héron bihoreau ou héron gris est une espèce d'oiseaux échassiers de la famille des Ardeidés que l'on trouve dans de nombreuses parties du monde. Ces oiseaux sont de taille moyenne, à long cou, longues pattes et long bec. Sa calotte et son manteau sont noirs tandis que les ailes et la queue sont grises. Les parties inférieures sont blanches et il présente des pâtes et des doigts jaunes verdâtres. Le cou est replié en S en repos et en vol, tendu en alerte ou en attente d'une proie (poissons, vers ou insectes). Le bihoreau est un oiseau nocturne se nourrissant du crépuscule à l'aube.



### LE VANNEAU HUPPE


#### (*Vanellus vanellus*)

Le vanneau huppé appartient à l'ordre des charadriiformes et à la famille charadriidés. Il trouve son nom de sa huppe noire caractéristique et dressée à l'arrière de sa calotte. L'espèce est présente chaque année en bord de Touvre, au profit de sa migration. Son plumage est vert sombre sur ses parties supérieures et blanc sur la partie inférieure. L'espèce est limicole (le terme émane du latin limicola « qui se tient dans le limon »). Elle présente donc de longues pattes et fréquente les milieux humides où elle trouve les insectes dont elle se nourrit.

### CYGNE TUBERCULE

#### (*Cygnus olor*)

Grand oiseau (jusqu'à 1.50 m) le cygne aurait été rapporté d'Angleterre par Richard Cœur de Lion. Le cygne se nourrit essentiellement de végétaux aquatiques ou terrestres (herbes, feuilles, mousse). Le nid est confectionné par la femelle près de l'eau ; elle utilise les roseaux, les herbes que lui apporte le mâle. La ponte a lieu entre mars et mai. Chaque femelle pond de 5 à 7 œufs, les œufs éclosent au bout de 36 jours environ ; pendant toute cette période les adultes peuvent se montrer agressifs (par exemple, le mâle peut tourner autour des canoés, pour que la femelle ne soit pas dérangée pendant qu'elle couve) ; les deux parents élèvent les petits qui ne volent qu'au bout de 4 ou 5 mois.



Cette signalétique est mise en place par le SYBRA (Syndicat du Bassin des Rivières de l'Angoumois).

Tél : 05.45.38.16.71  
[www.rivieres-angoumois.fr](http://www.rivieres-angoumois.fr)

Conception du projet & rédaction des textes : SYBRA  
Réalisation graphique : Agence42  
Imprimeur : MAUDET